

## *Escore de pontos da hepatite autoimune*

Sexo		
Feminino +2		
Masculino 0		
Relação FA/ALT (xLSN)		
< 1,5 +2		
1,5 a 3,0 0		
> 3,0 -2		
Níveis de globulinas (xLSN)		
> 2,0 +3		
1,5 a 2,0 +2		
1,0 a 1,5 +1		
< 1,0 0		
ANA, SMA ou LKM-1		
> 1/80 +3		
1/80 +2		
1/40 +1		
< 1/40 0		
Anticorpo antimitocôndria (AMA)		
Positivo -4		
Negativo 0		
Marcadores virais de hepatites		
Positivos -3		
Negativos +3		
História recente de drogas hepatotóxicas		
Positiva -4		
Negativa +1		
Consumo de álcool		
< 25 g/dia +2		
> 60 g/dia -2		
Outra doença auto-imune		
Outra doença auto-imune no paciente ou em parentes de 1º grau +2		
Parâmetros adicionais opcionais (apenas em pacientes negativos para ANA, SMA, LKM-1): qualquer auto-anticorpo definido como específico para o fígado (anti-SLA, anti-LP, anti-LC1, anti-ASGPR, p-ANCA)		
Positivo +2		
Negativo 0		
Marcadores genéticos		
HLA B8-DR3 ou DR4 +1		
Histologia		
Hepatite de interface +3		
Infiltrado predominantemente linfoplasmocitário +1		
Roseta de hepatócitos +1		
Nenhum dos acima -5		
Alterações biliares -3		
Outras alterações (sugestivas de outras etiologias) -3		
Resposta ao tratamento		
Completa +2		
Recaída +3		
Fonte: adaptado de International Autoimmune Hepatitis Group, 1999.		TOTAL

Interpretação do escore de pontos

Antes do tratamento:

- diagnóstico definitivo de HAI: > 15;
- diagnóstico provável de HAI: 10 a 15.

Depois do tratamento:

- diagnóstico definitivo de HAI: > 17;
- diagnóstico provável de HAI: 12 a 17.